

# DESCONFORTO RESPIRATÓRIO PRECOCE: DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL ENTRE TAQUIPNEIA TRANSITÓRIA DO RECÉM-NÁSCIDO E PNEUMONIA NEONATAL



RUBIA SOARES DE SOUSA GOMES<sup>1</sup>; JULIA RAQUEL FELIPE CALDEIRA<sup>1</sup>; PEDRO HENRIQUE ARAÚJO DA SILVEIRA<sup>1</sup>; MARIANA CORDEIRO DIAS<sup>1</sup>; EMILLY DE ALMEIDA COSTA<sup>1</sup>; GIOVANNA DOS SANTOS FLORA<sup>1</sup>; CAROLINA AMORIM RIBEIRO<sup>1</sup>; REBECA MUNIZ GOMES DA COSTA SILVA<sup>1</sup>; ABILA DUTRA OLIVEIRA<sup>1</sup>; ANACAROLINA DONDONI FAVERO<sup>1</sup>; MARIANA GROLLA GUIMARÃES<sup>1</sup>; TASSIANNY FÉLIX PEREIRA<sup>1</sup>; HORTENCIA TEIXEIRA DE MARAIS<sup>2</sup>; FERNANDA KELLY ALVES GOMES<sup>2</sup>; GLADMA REJANE RAMOS ARAUJO DA SILVEIRA<sup>3</sup>.

Faculdade de Ciências Gerenciais de Manhuaçu<sup>1</sup>/ Universidade Federal de Juiz de Fora<sup>3</sup>/ Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória<sup>4</sup>  
rubiasousa.gomes@gmail.com

**RESUMO:** O trabalho relata o diagnóstico diferencial entre taquipneia transitória do recém nascido e pneumonia neonatal.

**INTRODUÇÃO:** Desconforto Respiratório Precoce é acomete recém nascidos (RN) nas primeiras horas de vida, com sinais como cianose e taquipneia (FR > 60 irpm).

**DESCRIÇÃO DO CASO:** RN, 38 semanas e 4 dias, mãe com histórico gestacional de infecção do trato urinário, nascido de cesárea eletiva, não responsivo a estímulo tátil, necessitando de ressuscitação, foi transferido para Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. Chegou na unidade entubado, normotérmico, com desconforto respiratório, saturando a 77%, sem demais alterações. O paciente foi extubado, iniciou-se ventilação não invasiva (VNI), antibioticoterapia empírica. Paciente permaneceu em VNI por 3 dias, em Hood por 2 dias e Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) por 3 dias, no 8º dia de internação estava em ar ambiente, sem intercorrências. Paciente teve alta para acompanhamento ambulatorial, com solicitação para ecocardiograma, aguardando resultado de triagem neonatal e nova cultura.

**DISCUSSÃO:** A Taquipneia Transitória do Recém-Nascido ou Síndrome dos Pulmões úmidos, acontece nas primeiras horas de vida, devido ao retardo da absorção do líquido pulmonar fetal após o nascimento, levando ao desconforto respiratório, porém possui curso benigno. A pneumonia neonatal é uma grande causa de morte neonatal, possui difícil diagnóstico devido a sua clínica e exames laboratoriais inespecíficos. O exame radiográfico de pneumonia neonatal se assemelha ao da taquipneia transitória e o início da antibioticoterapia pode influenciar o resultado da cultura, dificultado o diagnóstico

**CONCLUSÃO:** Observa-se que as semelhanças das patologias supracitadas dificultam os seus diagnósticos, o que torna imprescindível o início do antibiótico empírico e suporte ventilatório, em virtude de que a pneumonia neonatal possui mortalidade significativa.

**REFERÊNCIAS:** ALBAN, Elisa Simionato. et al. Cesárea Eletiva: Complicações Maternas e Fetais. Arquivos Catarinenses de Medicina, Criciúma-SC, v.38, n.1, p. 45- 48, 2009.

AVERY, G. B. et al. Neonatologia Fisiopatologia e Tratamento do RecémNascido. 4 ed. Rio de Janeiro: Medsi. 1999.