

LESÕES MAIS COMUNS DE RECÉM NASCIDOS EM SALA DE PARTO DE UM SERVIÇO PRIVADO DE NEONATOLOGIA

*Fabiano Cunha Gonçalves, Érika da Cunha Ibiapina,
Wandrea Varão Marcinoni, Sandra de Caldas Lins*

Serviço de Neonatologia do Hospital Santa Marta - Brasília/ DF



As lesões causadas durante o processo de nascimento ocorrem, geralmente, na passagem pelo canal de parto.

Neste estudo foram analisadas as lesões mais comuns que ocorreram no período de um ano dos nascimentos ocorridos em 2019 em um serviço privado de neonatologia de uma UTI neonatal terciária.

Em casos raros, nervos são danificados ou ossos são fraturados, entretanto a grande maioria das lesões se resolve sem tratamento. Um parto difícil, com risco de lesões no feto, pode ocorrer se o canal de parto for excessivamente pequeno ou se o feto for muito grande, como em fetos macrossômicos ou filhos de mãe diabética.

Frequência das Lesões:

64% bossa serossanguínea
35,9% de cefalohematoma
0,1% hemotoma subdural

Não foram registradas fraturas no crânio no período de 2019 durante atendimento em sala de parto.

**54% dos partos foram recém-nascidos do sexo masculino
46% feminino**

5% apresentaram algum grau leucomalácia periventricular evidenciada no primeiro ecocerebral quando realizado.

Lesões também são mais prováveis quando o feto está em uma posição anormal no útero antes do nascimento. No geral, a taxa de lesões ao nascimento atualmente é muito mais baixa do que em décadas anteriores devido a melhores avaliações pré-natais com ultrassonografia e pela opção de indicação precisa de cesariana.



RN com bossa serossanguínea que representou 64% das lesões mais frequentes na Sala de Parto em 2019 no Serviço de Neonatologia do Hospital Santa Marta, Brasília/DF